



Have a Healthy Life

نحوه صحیح مصرف:

- نیم ساعت پس از عده غذایی به طور کامل بلعیده شود.
- بیمار را باید در خصوص احتمال بروز عوارض افت فشار خون وضعیتی مانند سرگیجه بدبال مصرف این دارو و احتیاط کامل در رانندگی، کار با ماشین آلات و انجام امور خطرناک مطلع ساخت.
- دارو در فواصل زمانی منظم میل و دوره درمان کامل شود.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به بد آوردن، مصرف شود، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری گردد. اگر دارو به مدت چند روز مصرف نشد، قبل از مصرف مجدد با پزشک مشورت شود.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه گردد.

مهمتیرین و شایع ترین عوارض دارویی: سستی و ضعفه، تاری دید، افسردگی، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، اختلالات دستگاه گوارش، سردرد و اکتشاهی حساسیتی، افت فشار خون، ادم، طیش قلب، نعوظ دادن، خارش، راش، رینیت، سنکوپ، تاکی کاردی و اختلالات کبدی

مشخصات دارو: هر جعبه حاوی ۳۰ عدد کپسول پیوسته رهش تامسولوسین ۰/۴ میلی گرمی (۳ لیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارویی باشد.

شرایط نگهداری:

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری شود.
- دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری شود.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده اند، خودداری شود.

Tamsulosin

E.R. Capsules 0.4 mg

تامسولوسین

کپسول پیوسته رهش ۰/۴ میلی گرم

مکانیسم اثر دارو: تامسولوسین با مسدود کردن گیرنده های در عضلات صاف پروستات، سبب شل شدن عضله حلقوی دور مجرای پیشابرای شده و باعث تسهیل خروج ادرار می شود.

موارد مصرف: درمان علامتی بزرگی خوش خیم پروستات (BPH)

موارد منع مصرف: حساسیت نسبت به تامسولوسین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن، سابقه افت فشار خون وضعیتی و سنکوپ

مصرف در بارداری و شیردهی:

• مصرف در بارداری: گروه B

• مصرف در شیردهی: این دارو در زنان کاربردی ندارد.

احتیاط: بیماری های کبدی، نارسایی کلیوی، سابقه ابتلا به فشار خون پایین، قبل از جراحی آب مروارید، هر گونه آلرژی به سولفانامیدها

تدخالت دارویی: سایمتیدین، وارفارین، ترکیبات مسدود کننده آدرنرژیک

مقدار مصرف: در درمان علائم و عوارض بزرگی خوش خیم پروستات (BPH)، مقدار ۰/۴ میلی گرم یک بار در روز و نیم ساعت بعد از وعده غذایی تجویز می گردد. در افرادی که پاسخ مناسبی به درمان بازدوز یاد شده نداشته باشند، بعد از تاچهار هفته می توان دوز دارو را تا ۰/۸ میلی گرم، یک بار در روز افزایش داد

در صورتی که وقفه ای به مدت چند روز در مصرف این دارو رخ دهد لازم است شروع مجدد درمان با مقدار ۰/۴ میلی گرم باشد.