



100 mg

300 mg

400 mg

Have a Healthy Life

Gabapentin

400mg&300,100Capsules

گاباپنتین

کپسول ۱۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم

● کودکان

درمان کمکی **صرع پارشیال**: در کودکان ۳ تا ۱۲ سال ابتدا به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار مقدار ۱۵-۱۰ میلی‌گرم روزانه محاسبه شده و در سه نوبت منقسم تجویز می‌شود. سپس بر اساس پاسخ بیمار به درمان مقدار مصرف تنظیم می‌گردد. براین اساس برای کودکان بالای ۵ سال معمولاً مقدار مصرف موثر ۲۵-۲۵ mg/kg/day در سه نوبت منقسم و برای کودکان ۳ تا ۴ سال نیز مقدار مصرف ۴۰ mg/kg/day در سه نوبت منقسمی باشد.

توجه: تجویز داروی گاباپنتین در کودکان زیر ۱۲ سال مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی مطالعه نشده است.

نحوه صحیح مصرف: دارو را به طور کامل بلعیده و از باز کردن کپسول و له کردن آن در دهان خودداری شود. این دارو را می‌توان همراه با غذا یا بدون آن مصرف نمود. دو ساعت قبل و یا بعد از مصرف این دارو از مصرف داروهای که در درمان سوء هاضمه به کار می‌روند، خودداری شود. به علت بروز تاری دید یا دوبینی، گیجی، خواب‌لودگی، اختلالات فکری یا بهارهای حرکتی، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری شود. دارو را در فواصل زمانی منظم میل نمایند. بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنند. اگر دارو را به مدت چند روز مصرف نکردند قبل از مصرف مجدد با پزشک خود مشورت کنند. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنند، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایند. در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایند.

مهمترین و شایع‌ترین عوارض دارویی: خواب‌آلودگی، تاری دید یا دوبینی، گیجی، بی‌ثباتی عاطفی، افسردگی، تهوع و استفراغ، برونشیت، عفونت‌های ویروسی، تب، سرگیجه، خستگی، نیستاکموس، رینیته، لرزش، ضعف، سردرد، ادم محیطی، افزایش وزن، اسهال، یبوست و خشکی دهان. **مشخصات دارو:** هر جعبه حاوی ۱۰۰ عدد کپسول گاباپنتین ۱۰۰ و یا ۳۰۰ و یا ۴۰۰ میلی‌گرمی (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه راهنمای مصرف دارویی باشد.

● شرایط نگهداری:

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری شود.
- دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری شود.
- از مصرف داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده‌اند، خودداری شود.

مکانیسم اثر دارو: مکانیسم دقیق داروی گاباپنتین ناشناخته است. این دارو به جایگاه خاصی در اعصاب قشر مغز متصل شده و با انتقال اسیدهای آمینه از طریق غشاء سلول تبادل می‌کند. این دارو ممکن است باعث افزایش آزادسازی GABA از محل غیر وزیکولی شود.

موارد مصرف:

- درمان کمکی صرع پارشیال همراه با داروهای ضد تشنج دیگر
- درمان دردهای نورالژی (درد عصبی) پس از عفونت هرپسی و نوروپاتی
- **موارد منع مصرف:** در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به داروی گاباپنتین و یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن
- **مصرف در بارداری و شیردهی:**
- مصرف در بارداری: گروه C
- مصرف در شیردهی: از آنجا که این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی تنها در حالتی مجاز است که پزشک لزوم مصرف آن را تشخیص بدهد.
- **احتیاط:** افسردگی و یا مشکلات خلقی، دیابت شیرین نوع ۲، نارسایی کلیوی و یا تحت همودیالیز، بارداری یا قصد باردار شدن، دوران شیردهی، **تداخلات دارویی:** داروهای آنتی‌اسید، مورفین، سایتمیدین، ناپروکسن، الکل
- **مقدار مصرف:** مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

● بیماران بالای ۱۲ سال:

درمان کمکی **صرع پارشیال**: ۹۰۰ میلی‌گرم در روز در ۳ نوبت منقسم که بر اساس پاسخ بیمار به درمان به تدریج تا ۱۸۰۰ میلی‌گرم افزایش می‌یابد. حداکثر مقدار تجویزی تا ۳۶۰۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد. زمانی که دارو برای ۳ بار در روز تجویز می‌شود توصیه می‌شود فاصله بین دو نوبت از مصرف ۱۲ ساعت باشد. **توجه:** مقدار **تجویزی در افراد سالمند و بیماران دارای اختلال عملکرد کلیوی و یا تحت همودیالیز می‌باشند باید براساس عملکرد کلیه تنظیم گردد.**

درمان **دردهای عصبی پس از عفونت هرپسی:** روز اول مقدار ۳۰۰ میلی‌گرم هنگام خواب، روز دوم ۶۰۰ میلی‌گرم در روز در دو نوبت منقسم و روز سوم ۹۰۰ میلی‌گرم در سه نوبت منقسم تجویز می‌شود و مقدار مصرف براساس پاسخ بیمار به درمان تا حداکثر ۱۸۰۰ میلی‌گرم در روز قابل افزایش است.