




360° lipid & Cholesterol Control

**GET
DOWN
WITH**



Rousana®

Rosuvastatin 5,10,20,40mg



دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



وزارت علوم
و تحقیقات
و عالیات

روزان®

روزرواستاتین (قرص روکش دار، ۵، ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرم)

مکانیسم اثر:

قرص روزانا® با مهار آنزیم اصلی سازنده اولیه کلسترول در بدن، موجب کاهش تولید کلسترول می‌گردد.

موارد مصرف:

- درمان کمکی همراه رژیم غذایی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و تری‌گلیسرید خون در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه
- درمان اولیه یا کمکی جهت کاهش کلسترول بد (LDL) و کلسترول تام خون در بیماران مبتلا به انواع هایپرکلسترولمی فامیلیال
- پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی

موارد منع مصرف:

هرگونه حساسیت نسبت به داروی رزوواستاتین، مبتلا بودن به بیماری فعال کبدی و یا افزایش بدون توضیح آنزیم‌های کبدی، بارداری و شیردهی

صرف در بارداری و شیردهی:

صرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است (گروه X) و در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورت لزوم استفاده از آن، شیردهی باید قطع شود.

تداخلات دارویی:

آمیودارون، دیگوکسین، دیلتیازم، ورآپامیل، جمفیبروزیل، نیاسین، آنتی‌اسیدها، سایمتیدین، رانیتیدین، کلستیرامین، ضدقارچ‌های آزول، آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولیدی، سیکلوسپورین، ضدبارداری‌های خوراکی

مقادیر مصرف:

- در درمان بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی اولیه (شامل هتروزیگوت فامیلیال و غیر فامیلیال) و دیس‌لیپیدمی مختلط محدوده تجویز ۵ تا ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد. میزان دوز نگهدارنده دریافتی براساس نیاز بیمار و پاسخ‌های درمانی در طی یک دوره ۴-۶ هفته‌ای توسط پزشک تنظیم می‌گردد. حداکثر مقدار تجویزی ۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
- در درمان هایپرکلسترولمی فامیلیال دوز تجویزی ۲۰ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد. حداکثر مقدار تجویزی ۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
- در پیشگیری از حملات قلبی و سکته‌های مغزی ۲۰ میلی‌گرم یک بار در روز تجویز می‌گردد. در سالمندان بالای ۷۰ سال، بیماران نژاد شرق آسیا و یا بیماران مستعد میوپاتی مقدار دوز شروع ۵ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد که در صورت نیاز به ۲۰ میلی‌گرم یک بار در روز افزایش پیدا می‌کند. حداکثر مقدار تجویزی ۲۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
- در صورت مصرف هم زمان با سیکلوسپورین حداکثر مقدار تجویزی ۵ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد.
- در صورت مصرف هم زمان با فیربرات‌ها حداکثر مقدار تجویزی ۱۰ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد.
- در بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه (کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه) مقدار دوز شروع ۵ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد. حداکثر مقدار تجویزی ۱۰ میلی‌گرم یک بار در روز می‌باشد.

توجه: مصرف مطمئن و بی خطر این دارو در کودکان زیر ۸ سال هنوز به اثبات نرسیده است.

نحوه صحیح مصرف:

- در دوران مصرف این دارو، از الکل و آب گریپ فروت استفاده نشود و دوره درمان کامل شود.
- این دارو را بدون در نظر گرفتن وعده غذایی به صورت تک دوز و در یک زمان معین مصرف نمایند.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن مصرف شود، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری گردد.

عارضات دارویی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض ذکر شده یا هرگونه عارضه دیگر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت شود: سردرد، اسهال، تهوع، سرگیجه، ضعف عضلانی، درد و گرفتگی عضلات و یبوست.

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی ۳۰ عدد قرص روزانا®، ۵، ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرمی (سه بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

Reference:

Drug facts and comparisons 2016