


Have a Healthy Life



# Aldocumar

Warfarin Sodium 5mg Tablet



OSHAS 18001 / 2007  
ISO 9001 / ISO 22381  
EN ISO 14001 / ISO 14004  
EN ISO 45001 / ISO 45004



دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- محصول شرکت آلدو یونیون اسپانیا (Since 1959)
- دارای ایمنی و اثربخشی تایید شده در اسپانیا
- دارای جذب سریع گوارشی
- دسترسی خونی بالاتر از ۸۵٪ در مدت ۱۵ دقیقه



دوسن-مشترکه ملکیت-لائست-لاینز

# قرص آلدومار®

وارفارین سدیم ۵ میلی گرمی

**گروه دارویی:** داروهای خوراکی ضد انعقاد خون

**مکانیسم اثر:** مهار فاکتورهای انعقادی از طریق کاهش اثر ویتامین K در فرآیند انعقاد خون (اثر غیر مستقیم)

**موارد مصرف:**

- جلوگیری از لخته شدن خون در شرایطی که ریسک تشکیل لخته خون بالاست مانند برشی بیماری‌های قلبی (امولی در روماتیسم قلبی و فیبریلاسیون هلیزی)

• پیشگیری از تشکیل هرگونه لخته خون یا بزرگ تر شدن لخته خون (ترومیوز وریدی) در عروق پا، شش یا قلب

• پیشگیری از تشکیل لخته خون پس از نصب دریچه‌های مصنوعی قلب

• پیشگیری از حملات اسکمیک گذرا

**موارد منع مصرف:**

• هرگونه حساسیت نسبت به داروی وارفارین یا سایر اجزای تشکیل دهنده دارو

• دوران بارداری تا ۴۸ ساعت پس از زایمان

• دیسکرازی خونی، هموفیلی

• جراحی‌های اغیر اصلی، چشم‌ها یا سایر جراحی‌های باز در سطح وسیع

**مصرف در بارداری و شیردهی:**

• مصرف در بارداری: گروه X

- مصرف در دوران شیردهی: مقداری کم و بی خطر از این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد. در صورت کمبود ویتامین K در نوزاد، احتمال بروز خطر خونریزی وجود دارد.

**تخالخات دارویی:**

فرآورده‌های حاوی الكل، ضد آرتمی‌ها (آمیودارون، بروبافنون)، داروهای ضد صرع (کاربامازبین، فنوباربیتال، پرمیدون)، داروهای ضد قارچ (فلوکونازول، ایتراتکونازول، کنتوکونازول، میکونازول، وریکونازول)، اپریپیتان، آلبولیک، اندروزن‌ها، داروهای ضد دیابت خوراکی، سالیسیلات‌ها، سفتیریاکسون، کلامفینیکل، سایامیتین، کلوفیرات، دانارول، دکستران، دی‌پیریدامول، دی‌سولفیرام، کلاریتروماسین، اریتروماسین، مترونیدازول، استاماتینویل، جم‌فیبروزیل، ایندوموتاسین، ایپیوروفن، مفناهیک اسید، اکسی‌فن‌بوتازون، بروپیل تیواوراسیل، کیندین، سولفامیدها، هورمون‌های تیروپیید، آنتی‌اسیدها، اسکوربیک اسید، ویتامین K، داروهای ضد بارداری، استروژن‌ها، گریزوفولوین، کلستیرامین، نفسیلین و ریمامین.

**مقدار مصرف:**

مقدار مصرف هر دارو برپاشک معین می‌نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

• بزرگسالان: مقدار اولیه در روز اول ۵-۱۰ میلی گرم تجویز می‌گردد و سپس مقدار مصرف مطلوب براساس نتایج زمان پروتومیین و INR تعیین می‌گردد.

• توصیه می‌گردد در بیماران مسن یا بیمارانی که اثر ضدانعدامی سریع مورد نیاز نمی‌باشد، مقدار اولیه تجویزی در روز اول، کاهش داده شود.

**نحوه صحیح مصرف:**

• دارو طبق دستور پرپاشک در یک زمان مشخص از روز مصرف و تمام دستورات پرپاشک انجام شود.

- برنامه ریزی برای کاهش وزن با مصرف داروهای شیمیابی با غایابی لاغری، تضمیم به افزایش مصرف غذاها و مکمل‌های حاوی ویتامین K یا برنامه ریزی برای انجام هر گونه عمل جراحی ایجاد ادامات دندانپزشکی به پرپاشک معلاج اطلاع داده شود.

**مهترین و شایع ترین عوارض دارویی:**

هر دارو به مواراز اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد بروز نمی‌کند. در صورت بروز خونریزی و کبوسی غیر طبیعی، قرمزی و یا قهوه‌ای شدن ادرار، مدفع سیاه و یا قیری شدن اسهال و ایجاد بشورات پوستی در دنایک، مصرف دارو را قطع نموده و سریع به پرپاشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

**مشخصات دارو:**

هر جعبه حاوی ۴۰ عدد قرص خط دار ۵ میلی گرمی (۲ بلیستر ۲۰ عددی) به همراه برگه راهنمای مصرف دارو می‌باشد.

**شرایط نگهداری:**

- در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت، در بسته‌بندی اصلی، دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته با داروهایی که بلیستر آنها صدمه دیده است، خودداری شود.

